











Qualité de la prise en charge en Soins de Suite et de Réadaptation

Indicateurs	Résultat de l'établissement 2009	Positionnement par rapport à la moyenne nationale	Atteinte de l'objectif national
 Tenue du dossier patient	51%	 (64%)	NON (80%)
<p>Qualité de tenue du dossier patient (score sur 100). La bonne tenue du dossier patient contribue à la coordination des soins entre les différents professionnels en charge du patient lors de son séjour à l'hôpital. Elle permet d'améliorer la sécurité et l'efficacité des soins au cours du séjour.</p>			
 Délai d'envoi du courrier	80%	 (79%)	OUI (80%)
<p>Conformité du délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation (% de dossiers conformes). Ce courrier doit être remis au patient le jour de sa sortie ou adressé à son médecin traitant (ou à la structure où est transféré le patient) dans les 8 jours. Une proportion élevée est le reflet d'une bonne coordination entre les différents professionnels de santé, permettant la continuité des soins après la sortie.</p>			
 Evaluation de la douleur	43%	 (42%)	NON (80%)
<p>Traçabilité de l'évaluation de la douleur (% de dossiers conformes). L'évaluation de l'intensité de la douleur doit être réalisée chez tous les patients afin de détecter ceux ayant besoin d'un traitement ou d'une adaptation des soins. Une proportion élevée est le reflet d'un bon dépistage et d'un bon suivi des patients douloureux, permettant une prise en charge adaptée et efficace.</p>			
 Dépistage des troubles nutritionnels	33%	 (53%)	NON (80%)
<p>Dépistage des troubles nutritionnels (% de dossiers conformes). La pesée du patient est importante à son entrée à l'hôpital, car elle va faciliter le dépistage des patients à risque de dénutrition ou d'obésité, permettant une prise en charge adaptée et efficace.</p>			
 Evaluation du risque d'escarre	14%	 (29%)	
<p>Traçabilité de l'évaluation du risque d'escarre (% de dossiers conformes) Patients ayant eu une évaluation du risque d'escarre par une échelle ou un jugement clinique dans les 7 jours suivant l'admission. L'escarre, qui altère la qualité de vie, peut provoquer une gêne douloureuse accompagnée d'une souffrance morale et physique et une limitation des capacités fonctionnelles.</p>			

Pour mieux comprendre

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont des mesures concrètes reflétant l'engagement de l'établissement dans la qualité de la prise en charge des patients.



: résultats au-dessus de la moyenne nationale ;



: résultats dans la moyenne nationale ;



: résultats en-dessous de la moyenne nationale.